

---

## Fe de errores

En el volumen 42, Especial Congreso (Arch Bronconeumol. 2006;42[Espec Congr]:84), en la comunicación “Seguimiento del carcinoma broncogénico: rendimiento de la broncoscopia sistématica”, los nombres de los autores publicados no son correctos. Los firmantes correctos son: *G. Ramos, G. Rubinos, R. Fernández, N. Mañes, H. Hernández, J.A. Gullon, C. Cabrera, R. Galindo e I. González.*

---

## Fe de errores

En el artículo de I. Urrutia et al titulado “Cambios en la prevalencia de asma en la población española del Estudio de Salud Respiratoria de la Comunidad Europea (ECRHS-II)”, publicado en Arch Bronconeumol. 2007;43(8):425-30, se ha detectado unas omisiones en la tabla II de la página 428. La tabla completa se adjunta a continuación:

TABLA II  
Prevalencia de hábito tabáquico en las 5 áreas del estudio español del ECRHS-II (n = 1.386)

	Albacete	Barcelona	Galdakao	Huelva	Oviedo	Total
Edad media (años)	40,56 ± 7,40	41,47 ± 6,98	40,60 ± 7,11	41,16 ± 7,27	42,57 ± 7,08	41,25 ± 7,20
Mujeres	163 (53%)	157 (58%)	182 (51%)	105 (51%)	124 (51%)	731 (53%)
Mediana de seguimiento (meses)	8,62 (8,04-9,29)	8,89 (8,38-9,35)	8,66 (8,33-8,89)	8,45 (7,88-8,87)	8,36 (7,99-8,77)	8,60 (8,14-9,03)
Tabaco						
No fumador en I ni en II	105 (34%)	92 (34%)	119 (33%)	60 (29%)	64 (26%)	440 (32%)
Cualquier categoría en I y exfumador en II	49 (16%)	58 (21%)	71 (18%)	36 (18%)	54 (22%)	268 (19%)
Nunca fumador o exfumador en I y actual fumador en II	15 (5%)	12 (4%)	11 (3%)	5 (2%)	8 (3%)	51 (4%)
Actual fumador en I y actual en II	128 (41%)	92 (34%)	131 (36%)	80 (39%)	97 (40%)	528 (38%)
Discrepancias	11 (4%)	18 (7%)	28 (8%)	23 (11%)	19 (8%)	99 (7%)

Los valores se indican como media ± desviación estándar, número de participantes (porcentaje) o mediana. No se encuentran diferencias significativas por lo que se refiere al hábito tabáquico entre las áreas ( $p = 0,08$ ).